


## Evolution des degrés jour chauffage Climat passé et futur

### 1. Support à la lecture du graphique



4 séries de données sont représentées sur le graphique :

**Série 1** 'panache gris' :

Cumuls annuels de degrés-jours chauffage simulés par un ensemble de modèles (DRIAS 2020) sur la période 1971 – 2005.

Le panache correspond à l'intervalle de plus grande probabilité (entre les centiles 17% et 83%)

**Série 2** 'panache violet' :

Cumuls annuels de degrés-jours chauffage simulés par un ensemble de modèles (DRIAS 2020) pour le scénario de fortes émissions RCP 8.5 sur la période 2006-2100.

Le panache correspond à l'intervalle de plus grande probabilité (entre les centiles 17% et 83%)

**Série 3** 'panache orangé' :

Cumuls annuels de degrés-jours chauffage simulés par un ensemble de modèles (DRIAS 2020) pour le scénario d'émissions modérées RCP 4.5 sur la période 2006-2100.

Le panache correspond à l'intervalle de plus grande probabilité (entre les centiles 17% et 83%)

**Série 4** 'panache vert' :

Cumuls annuels de degrés-jours chauffage simulés par un ensemble de modèles (DRIAS 2020) pour le scénario de faibles émissions RCP8.5 sur la période 2006-2100.

Le panache correspond à l'intervalle de plus grande probabilité (entre les centiles 17% et 83%)

## 2. Définitions

Degré-jour méthode chauffagiste :  $(17 - TMq)$  si  $TMq < 17^\circ$

Température moyenne quotidienne (TMq) :  $TMq = (TNq + TXq)/2$

Température minimale quotidienne (TNq) : température minimale observée entre J-1 à 18 heures UTC et J à 18 heures UTC

Température maximale quotidienne (TXq) : température maximale observée entre J à 06 heures UTC et J+1 à 06 heures UTC

## 3. Données et méthodes

### La modélisation climatique :

Les simulations climatiques sont réalisées à partir de modèles de circulation générale, qui prennent en compte différents scénarios de référence de l'évolution du forçage radiatif appelés RCP (Representative Concentration Pathway). Par rapport aux modèles de prévision, une spécificité essentielle des modèles climatiques est de ne pas être du tout rappelé vers des observations. Le système climatique simulé évolue totalement librement ; il reçoit de l'énergie sous forme de rayonnement solaire et en perd sous forme de rayonnement infrarouge émis vers l'espace. Le climat simulé (température, précipitations, etc.) est le résultat de cet ajustement entre énergie reçue et énergie perdue. La conservation de l'énergie, et de façon plus générale les échanges d'énergie, sont donc fondamentaux pour un modèle climatique, et leur modélisation est la première préoccupation des climatologues.

Ces modèles permettent d'élaborer des projections climatiques représentatives de différents scénarios possibles d'évolution du climat.

### Les scénarios RCP :

3 scénarios RCP sont considérés :

- RCP 8.5, correspondant à un scénario avec fortes émissions de gaz à effet de serre (GES)
- RCP 4.5, correspondant à un scénario avec émissions modérées de GES
- RCP 2.6, correspondant à un scénario avec faibles émissions de GES

Le nombre qui suit l'acronyme RCP est le forçage radiatif pour l'année 2100 en Watt par mètre carré.

### Les projections climatiques utilisées :

1. Le jeu DRIAS-2020, constitué d'un ensemble multi-modèles (12 couples GCM/RCM) issu des modélisations Euro-Cordex, corrigé ensuite par la méthode Adamont (Météo-France) :

Le programme Euro-Cordex met à disposition sur l'Europe un ensemble de simulations climatiques basé sur différents modèles utilisant des descentes d'échelle statistiques et dynamiques, forcés par les modèles globaux utilisés dans les rapports du GIEC.

A partir de ce super ensemble, une sélection a été réalisée afin de déterminer un sous-ensemble, permettant de couvrir le mieux possible la gamme des changements futurs de température et précipitations sur le territoire de France métropolitaine. Ce jeu de données a ensuite été retraité pour le territoire français en appliquant une méthode de correction (Adamont) utilisant la ré-analyse Safran (cette ré-analyse 1959-2013 constitue la référence pour le climat observé). L'ensemble multi-modèles résultant est constitué de 12 modèles pour les projections climatiques associées au RCP8.5, 10 modèles pour le RCP4.5, 8 modèles pour le RCP2.6 et 12 modèles pour les simulations du climat passé.

2. Les produits statistiques élaborés à partir de l'ensemble multi-modèles DRIAS-2020 : les centiles de la distribution.

L'approche multi-modèles permet de représenter la dispersion des modèles, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre un paramètre donné, et ainsi prendre en compte l'incertitude liée à la modélisation. Le centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon de population

Par exemple, la médiane, qui correspond au centile 50%, est la valeur seuil pour laquelle 50% des valeurs de la distribution sont plus élevées.

Ces centiles peuvent être représentés sous forme de panaches pour les séries temporelles, ou bien de cartes représentant les valeurs des centiles en chaque point de grille de la surface modélisée.

Dans le jeu DRIAS-2020, plusieurs centiles et valeurs extrêmes sont disponibles ; les évolutions de températures présentées ici se basent sur les quantiles 17 et 83 % qui constituent les enveloppes des panaches associés à chaque scénario.

Remarque : Dans le cas du produit 'Degré-jour chauffage', les données disponibles ont été filtrées en fonction de leur altitude, afin de ne pas introduire de biais dus aux effets de relief. Seuls les points d'altitude  $\leq 500$  mètres ont été retenus.

#### 4. Références

Drias, les futurs du climat

[www.drias-climat.fr](http://www.drias-climat.fr)

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique : rapports climat de la France au XXI<sup>e</sup> siècle

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Volume-4-Scenarios-regionalises.html>

Euro-Cordex

<http://www.euro-cordex.net>