


PHYSIQUE

Jean ZINN-JUSTIN

Transitions de phase et groupe de renormalisation



 CNRS EDITIONS

Extrait de la publication


EDP
SCIENCES



Jean Zinn-Justin

Transitions de phase
et groupe
de renormalisation

S A V O I R S A C T U E L S

EDP Sciences/CNRS ÉDITIONS

Publié avec le concours du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

© **2005, EDP Sciences**, 17, avenue du Hoggar, BP 112, Parc d'activités de Courtabœuf, 91944 Les Ulis Cedex A

et

CNRS ÉDITIONS, 15, rue Malebranche, 75005 Paris.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Des photocopies payantes peuvent être réalisées avec l'accord de l'éditeur. S'adresser au : Centre français d'exploitation du droit de copie, 3, rue Hautefeuille, 75006 Paris. Tél. : 01 43 26 95 35.

ISBN EDP Sciences 2-86883-790-5

ISBN CNRS ÉDITIONS 2-271-06319-1

Table des matières

Introduction	xiii
Bibliographie	xvii
1 Théorie quantique des champs et groupe de renormalisation	1
1.1 L'électrodynamique quantique : une théorie quantique des champs	3
1.2 L'électrodynamique quantique et le problème des infinis	5
1.3 Méthode de renormalisation	8
1.4 Théorie quantique des champs et groupe de renormalisation	10
1.5 Le triomphe de la théorie quantique des champs : le Modèle Standard	12
1.6 Phénomènes critiques : d'autres infinis	15
1.7 Le groupe de renormalisation de Kadanoff–Wilson	17
1.8 Théories quantiques des champs effectives	19
2 Valeurs moyennes gaussiennes. Méthode du col	23
2.1 Fonction génératrice	24
2.2 Valeurs moyennes gaussiennes. Théorème de Wick	24
2.2.1 Intégrales gaussiennes paires	25
2.2.2 Intégrale gaussienne générale	26
2.2.3 Valeurs moyennes gaussiennes et théorème de Wick	27
2.3 Mesure gaussienne perturbée. Contributions connexes	28
2.3.1 Mesure gaussienne perturbée	28
2.3.2 Contributions connexes	30
2.4 Diagrammes de Feynman	31
2.5 Valeurs moyennes. Fonction génératrice. Cumulants	32
2.5.1 La fonction à deux points	32
2.5.2 Fonctions génératrices. Cumulants	34
2.6 Méthode du col	35
2.6.1 Intégrale réelle	36
2.6.2 Intégrale de contour complexe	39

2.7	Méthode du col à plusieurs variables. Calcul des fonctions génératrices	42
2.7.1	Méthode du col	42
2.7.2	Calcul des fonction génératrices	43
3	Universalité et limite continue	51
3.1	Théorème de la limite centrale des probabilités	51
3.1.1	Transformation de Fourier	52
3.1.2	Théorème de la limite centrale et conséquences	54
3.1.3	Remarques diverses	56
3.1.4	Variables aléatoires à valeurs entières	58
3.2	Universalité et points fixes de transformations	61
3.2.1	Situation générique	62
3.2.2	Distribution centrée	64
3.3	Marche au hasard et mouvement brownien	66
3.3.1	Marche dans l'espace continu	67
3.3.2	Invariance par translation et localité	67
3.3.3	Fonction génératrice des cumulants	69
3.3.4	Marche au hasard : comportement asymptotique	70
3.3.5	Limite du temps continu	71
3.3.6	Corrections à la limite continue	72
3.3.7	Marche au hasard sur réseau	73
3.3.8	Séries de Fourier	75
3.3.9	Comportement asymptotique. Limite continue	76
3.3.10	Dilatation de l'échelle des temps et points fixes	78
3.4	Marche au hasard : remarques complémentaires	79
3.4.1	Distribution asymptotique	79
3.4.2	Équilibre détaillé	80
3.5	Mouvement brownien et intégrale de chemin	81
4	Mécanique statistique classique : une dimension	89
4.1	Interactions de proches voisins. Matrice de transfert	90
4.1.1	Interactions de proches voisins	91
4.1.2	Matrice de transfert et fonction de partition	92
4.1.3	Espace de Hilbert et matrice de transfert	92
4.2	Fonctions de corrélation	94
4.2.1	Fonction à un point	94
4.2.2	Fonction de corrélation à p points	95
4.3	Limite thermodynamique	95
4.3.1	La fonction de partition	95
4.3.2	Fonction à un point	96
4.3.3	Fonction à deux points et longueur de corrélation	97
4.4	Fonctions connexes et propriété d'amas	98
4.4.1	Variable moyenne et limite thermodynamique	100
4.5	Modèles statistiques : exemples simples	101

4.6	Le modèle gaussien	103
4.6.1	Matrice de transfert gaussienne : propriétés algébriques	104
4.6.2	Matrice de transfert. Vecteurs et valeurs propres	106
4.6.3	Fonction de partition. Fonctions de corrélation	107
4.7	Modèle gaussien : limite continue	109
4.7.1	Limite continue et hamiltonien quantique	109
4.7.2	Décimation et limite continue	111
4.8	Modèles plus généraux : limite continue	113
5	Limite continue et intégrale de chemin	121
5.1	Intégrale de chemin gaussienne	121
5.1.1	Fonctionnelle génératrice. Dérivée fonctionnelle	123
5.1.2	Fonctions de corrélations gaussiennes	125
5.1.3	Calcul de l'intégrale gaussienne	126
5.2	Corrélations gaussiennes. Théorème de Wick	128
5.3	Mesure gaussienne perturbée	129
5.4	Calculs perturbatifs : exemples	131
5.4.1	Fonction de partition	131
5.4.2	Fonctions de corrélation	132
6	Systèmes ferromagnétiques. Corrélations	137
6.1	Systèmes ferromagnétiques : définition	138
6.1.1	Distribution de spin moyen et énergie libre	139
6.1.2	Transformation de Legendre	140
6.1.3	Distribution du spin moyen et potentiel thermodynamique	142
6.2	Fonctions de corrélation. Représentation de Fourier	143
6.2.1	Fonctions connexes et propriété d'amas	144
6.2.2	Invariance par translation et représentation de Fourier	145
6.3	Transformation de Legendre et fonctions de vertex	147
6.3.1	Transformation de Legendre : généralisation	147
6.3.2	Fonctions de vertex	150
6.3.3	Modèle gaussien	151
6.4	Transformation de Legendre et méthode du col	152
6.5	Fonctions de vertex à deux et quatre points	153
7	Transitions de phase : généralités et exemples	157
7.1	Température infinie ou spins indépendants	160
7.1.1	Modèle à un site	160
7.1.2	Spins indépendants	162
7.2	Transitions de phase en dimension infinie	163
7.2.1	Distribution de spin moyen. Fonctions thermodynamiques	164
7.2.2	Limites de basse et haute température	166
7.2.3	Distribution du spin moyen et transition de phase	167

7.3	Universalité en dimension infinie	169
7.4	Transformations, points fixes et universalité	172
7.5	Interactions de portée finie en dimension finie	174
7.5.1	Symétries discrètes : le modèle d'Ising	175
7.5.2	Symétries continues : l'exemple du groupe orthogonal	176
7.6	Modèle d'Ising : matrice de transfert	178
7.6.1	Matrice de transfert	178
7.6.2	Limite de dimension transverse infinie : transitions de phase	180
7.7	Symétries continues et matrice de transfert	183
7.8	Symétries continues et modes de Goldstone	185
8	Approximation quasi-gaussienne : universalité, dimension critique	189
8.1	Interactions à deux spins de courte portée	191
8.2	Le modèle gaussien : la fonction à deux points	194
8.2.1	Quantités homogènes	195
8.2.2	Fonction à deux points	196
8.2.3	Le comportement critique	197
8.2.4	Domaine critique	198
8.3	Modèle gaussien et marche au hasard	199
8.4	Modèle gaussien et intégrale de champ	200
8.4.1	Maximum de l'intégrand et fonction à deux points	201
8.4.2	Intégration gaussienne	203
8.4.3	Calcul explicite de la fonction à deux points	203
8.4.4	Réseau et limite continue	205
8.5	Approximation quasi-gaussienne	205
8.6	La fonction à deux points : universalité	207
8.7	Approximation quasi-gaussienne et théorie de Landau	210
8.8	Symétries continues et modes de Goldstone	212
8.9	Corrections à l'approximation quasi-gaussienne	214
8.9.1	Calcul de la correction	214
8.9.2	Le comportement critique	217
8.10	Approximation de champ moyen et corrections	220
8.10.1	Représentation de spins moyens et méthode du col	220
8.10.2	Méthode du col : un paramètre de développement	222
8.11	Points tricritiques	224
9	Groupe de renormalisation : formalisme général	231
9.1	Théorie statistique des champs. Hamiltonien de Landau	233
9.1.1	Théorie statistique des champs effective	233
9.1.2	Hamiltonien de Landau	234
9.2	Fonctions de corrélation connexes. Fonctions de vertex	235
9.3	Le groupe de renormalisation : idée générale	237
9.3.1	Équations de groupe de renormalisation	237

9.3.2	Fonctions génératrices et fonctions de vertex	238
9.3.3	Hamiltonien de point fixe	240
9.4	Flots des hamiltoniens : points fixes et stabilité	241
9.4.1	Points fixes et flot linéarisé	242
9.4.2	Classification des vecteurs propres	243
9.4.3	EGR : autre forme	244
9.4.4	Le domaine critique : propriétés d'échelle	245
9.5	Le point fixe gaussien	246
9.5.1	Le point fixe gaussien	247
9.5.2	Hamiltonien quadratique isotrope général	248
9.6	Perturbations propres : analyse générale	250
9.6.1	Perturbations propres	250
9.6.2	Représentation de Fourier	252
9.7	Un point fixe non gaussien : le développement en ε	253
9.7.1	Points fixes	253
9.7.2	Autres vecteurs propres	256
9.8	Valeurs propres et dimensions des polynômes locaux	258
10	Groupe de renormalisation perturbatif : calculs explicites	261
10.1	Hamiltonien critique et développement perturbatif	262
10.2	Diagrammes de Feynman à l'ordre d'une boucle	264
10.3	Point fixe et comportement critique	267
10.3.1	La fonction à deux points	267
10.3.2	La fonction à quatre points	268
10.3.3	Point fixe	270
10.3.4	La dimension du champ à l'ordre ε^2	271
10.4	Le domaine critique	273
10.4.1	Fonction à deux points	273
10.4.2	Groupe de renormalisation	274
10.4.3	Fonction à deux points : comportement d'échelle dans le domaine critique	276
10.5	Modèle avec symétrie orthogonale $O(N)$	277
10.6	Groupe de renormalisation près de la dimension 4	279
10.6.1	Hamiltonien critique et EGR	279
10.6.2	Domaine critique	280
10.7	Quantités universelles : résultats numériques	282
11	Théories des champs σ^4 : champ à N composantes	287
11.1	GR : remarques générales	288
11.2	Flots de gradient	289
11.2.1	Reparamétrisation	290
11.2.2	Flots et variation du potentiel	290
11.2.3	Points fixes et stabilité	291

11.3	Modèle avec anisotropie cubique	293
11.3.1	Groupe de renormalisation et points fixes	294
11.3.2	Flot linéarisé et valeurs propres	295
11.4	Expressions générales explicites : étude détaillée	296
11.4.1	Groupe de renormalisation	297
11.4.2	Stabilité du point fixe isotrope	298
11.4.3	Flots de gradients : points fixes, stabilité et dimension du champ	299
11.5	Exercice : modèle général à deux paramètres	302
12 Théorie statistique des champs :		
	développement perturbatif	307
12.1	Fonctionnelles génératrices	308
12.2	Théorie des champs gaussienne. Théorème de Wick	309
12.3	Développement perturbatif	311
12.3.1	Développement perturbatif	312
12.3.2	Diagrammes de Feynman : boucles	313
12.3.3	Diagrammes connexes et 1-irréductibles	314
12.3.4	Exemple : l'interaction σ^4	315
12.4	Développement en nombre de boucles	318
12.4.1	Ordre dominant : diagrammes en arbre	319
12.4.2	Ordre suivant : diagrammes à une boucle	320
12.5	Prolongement et régularisation dimensionnels	322
12.5.1	Prolongement dimensionnel	322
12.5.2	Régularisation dimensionnelle	323
12.5.3	Exemples	325
13 Théorie des champs σ^4 près de la dimension 4		
		331
13.1	Hamiltonien effectif. Renormalisation	332
13.1.1	Hamiltonien effectif	333
13.1.2	Renormalisation gaussienne	333
13.1.3	Analyse dimensionnelle et dimension critique	334
13.1.4	Théorème de renormalisation	336
13.2	Équations de groupe de renormalisation	338
13.2.1	EGR pour la théorie critique	339
13.2.2	Solution perturbative de l'EGR	340
13.3	Solution des EGR : le développement en ε	342
13.3.1	Solution générale	342
13.3.2	Calculs à l'ordre d'une boucle : point fixe et lois d'échelle	344
13.3.3	La fonction $\eta(g)$ à deux boucles et l'exposant η	346
13.4	Interaction effective et interaction renormalisée	348
13.5	Le domaine critique au-dessus de T_c	350
13.5.1	Solution des EGR	351
13.5.2	Fonctions à aimantation fixée ou au-dessous de T_c	353

14 Théorie $(\phi^2)^2$ avec symétrie $O(N)$: limite $N \rightarrow \infty$	355
14.1 Préliminaires algébriques	356
14.2 Intégrale sur le champ ϕ : le déterminant	357
14.2.1 Le déterminant : définition perturbative	358
14.2.2 Premiers diagrammes à une boucle : discussion	359
14.3 Limite $N \rightarrow \infty$: le domaine critique	361
14.4 La théorie des champs $(\phi^2)^2$ pour $N \rightarrow \infty$	364
14.5 Partie singulière de l'énergie libre et équation d'état	367
14.6 Les fonctions à deux points $\langle \lambda \lambda \rangle$ et $\langle \phi^2 \phi^2 \rangle$	369
14.7 Groupe de renormalisation et corrections aux lois d'échelles	372
14.7.1 Les fonctions du groupe de renormalisation	372
14.7.2 Corrections dominantes aux relations d'échelle	373
14.8 Le développement en $1/N$	375
14.8.1 Analyse dimensionnelle	375
14.8.2 Application : développement perturbatif, singularités infrarouges et comportement à grande impulsion	376
14.9 L'exposant η à l'ordre $1/N$	377
14.10 Le modèle σ non linéaire	378
15 Le modèle σ non linéaire	381
15.1 Le modèle σ non linéaire sur réseau	382
15.2 Développement de basse température	383
15.2.1 Paramétrisation	384
15.2.2 Développement perturbatif	386
15.2.3 Point fixe gaussien et perturbations	387
15.3 Limite continue formelle	389
15.4 Régularisation	390
15.5 Divergences d'impulsion nulle ou infrarouges	391
15.6 Groupe de renormalisation	393
15.6.1 Renormalisation et EGR	393
15.6.2 Calculs à l'ordre d'une boucle	395
15.7 Solution des EGR. Points fixes	397
15.7.1 Points fixes	398
15.7.2 Intégration des EGR : $d > 2, g < g^*$	399
15.8 Fonctions de corrélation : forme d'échelle	400
15.9 Le domaine critique : exposants critiques	402
15.10 Dimension 2	403
15.10.1 Le modèle non-abélien	404
15.10.2 Le cas abélien $N = 2$	405
15.11 La théorie des champs $(\phi^2)^2$ à basse température	407

16 Groupe de renormalisation fonctionnel	411
16.1 Intégration partielle et variation du hamiltonien	412
16.1.1 Intégration partielle	412
16.1.2 Forme différentielle	414
16.1.3 Évolution du hamiltonien	416
16.1.4 Fonctionnelle connexe et solution formelle	417
16.1.5 Fonctions de corrélation	419
16.1.6 Renormalisation du champ	420
16.2 Intégration sur les modes de grande impulsion et EGR	420
16.2.1 EGR	421
16.2.2 Représentation de Fourier	422
16.2.3 Développement en puissances du champ	423
16.2.4 Fonctions de corrélation	424
16.3 Solution perturbative : théorie ϕ^4	426
16.4 EGR : forme standard	430
16.5 Dimension 4	433
16.5.1 Conditions de renormalisation. Fonctions β et η	433
16.5.2 Solution des EGR à l'ordre g	435
16.5.3 Solution des EGR à l'ordre g^2	435
16.6 Point fixe : développement en ε	439
16.7 Stabilité locale du point fixe	441
16.7.1 Point fixe gaussien	442
16.7.2 Dimension $d = 4 - \varepsilon$: perturbations ϕ^2 et ϕ^4	444
16.7.3 Perturbations brisant la symétrie \mathbb{Z}_2	445
Appendice A : Compléments techniques	447
A.1 Fonctions Γ , ψ , δ	447
A.1.1 Distribution de Dirac	448
A.2 Le propagateur massif en dimension 2	449
A.3 Déterminants d'opérateurs	449
A.4 Le groupe orthogonal	450
A.5 Transformation de Fourier : décroissance et régularité	451
A.5.1 Mesures positives discrètes et séries de Fourier	451
A.5.2 Transformation de Fourier	455
Appendice B : Transitions de phase : généralités	459
B.1 Fondamental de la matrice de transfert	459
B.2 Paramètre d'ordre et propriété d'amas	460
B.3 Dynamiques stochastiques et transitions de phase	462
Appendice C : Développement en $1/N$: quelques calculs	465
C.1 Diagramme de Feynman à une boucle	465
C.2 La fonction à deux points à l'ordre $1/N$ pour $u \rightarrow 0$	466

Appendice D : Groupe de renormalisation fonctionnel :	
compléments	469
D.1 GRF et équations de champ	469
D.2 GRF : transformation de Legendre	472
D.3 GRF et régularisation dimensionnelle	475
Index	477

Introduction

LA THÉORIE QUANTIQUE DES CHAMPS est à la base d'une partie notable des développements théoriques de la physique du vingtième siècle. Le modèle qui décrit toutes les interactions fondamentales à l'échelle microscopique, en dehors de la gravitation, est une théorie quantique des champs. De façon plus surprenante, la théorie quantique des champs a permis de comprendre les propriétés macroscopiques singulières d'une large classe de transitions de phase au voisinage de la transition.

Cependant, à la différence de la mécanique newtonienne ou quantique non relativiste, la théorie quantique des champs dans sa formulation la plus immédiate conduit à de graves difficultés conceptuelles à cause de l'apparition d'infinis dans le calcul des observables physiques. Le problème des infinis a d'abord été résolu de façon empirique par une méthode appelée renormalisation. Cette méthode n'a trouvé une interprétation satisfaisante que plus tard, dans le cadre du *groupe de renormalisation*. Le problème des infinis a ainsi été relié à un phénomène inattendu, le non-découplage des différentes échelles de physique.

C'est dans le cadre de la physique statistique et des transitions de phase continues que la discussion de ces problèmes conceptuels est la plus simple. Cet ouvrage tente donc d'introduire de façon élémentaire les notions de limite continue et d'universalité dans les systèmes aléatoires à un grand nombre de degrés de liberté. Nous insisterons sur l'importance des mesures gaussiennes et leurs relations avec l'approximation de champ moyen et la théorie de Landau. Nous montrerons que les approximations quasi-gaussiennes ou de champ moyen ne peuvent pas décrire correctement les transitions de phase. Nous attribuerons cette difficulté au couplage d'échelles de physique très différentes, alors même que les interactions sont locales, c'est-à-dire à courte portée. Pour analyser ce problème, un concept nouveau est nécessaire : le groupe de renormalisation, dont les points fixes permettent de comprendre l'universalité de la physique à grande distance au-delà du champ moyen.

Les arguments de groupe de renormalisation conduisent alors à l'idée que les corrélations à grande distance près de la température de transition peuvent être décrites par des théories statistiques locales des champs, formellement des théories quantiques des champs en temps imaginaire.

Cet ouvrage, issue de trois années d'enseignement à l'université Paris 7, est organisé de la manière suivante.

Au chapitre 1, nous commençons par une courte introduction semi-historique, qui essaie de décrire l'évolution des idées depuis les premiers pas de la théorie quantique des champs [1–4] jusqu'à l'application des méthodes de groupe de renormalisation à la théorie des transitions de phase.

Dans le chapitre 2, nous avons rassemblé un certain nombre de résultats techniques sur les fonctions génératrices, les mesures gaussiennes et la méthode du col qui sont indispensables pour la compréhension de l'ouvrage.

Le chapitre 3 aborde plusieurs sujets essentiels de l'ouvrage : les notions de limite continue et d'universalité, à travers les exemples du théorème de la limite centrale et de la marche au hasard. Nous montrons que l'universalité a comme origine l'hypothèse de faible déviation de la valeur moyenne des distributions de probabilité, ce qui se traduit par une hypothèse de localité de la marche au hasard. Dans les deux cas, la propriété d'universalité se traduit par l'apparition de distributions gaussiennes asymptotiques. Nous montrons alors, qu'au-delà du calcul direct, l'universalité peut aussi se comprendre comme résultant de points fixes de transformations agissant sur l'espace des distributions de probabilité. Cela nous permettra, déjà à travers ces exemples très simples, d'introduire le langage du groupe de renormalisation. Enfin, l'existence de limites continues conduit naturellement à décrire les processus en terme d'intégrales de chemin.

Dans le chapitre 4, nous abordons le sujet principal de l'ouvrage, l'étude de systèmes de la physique statistique classique, à travers l'exemple de modèles uni-dimensionnels. Cela nous permet d'introduire le langage de la physique statistique, comme les fonctions de corrélation, la limite thermodynamique, la longueur de corrélation... Même si les systèmes uni-dimensionnels avec interactions de courte portée n'ont pas de transition de phase, il est possible de définir une limite continue au voisinage de la température nulle. De plus, dans le cas d'interactions à portée finie, ces modèles peuvent être résolues exactement par la méthode de la matrice de transfert, ce qui en fait des exemples pédagogiques intéressants.

La limite continue des modèles uni-dimensionnels conduit, de nouveau à des intégrales de chemin, dont nous discutons quelques propriétés au chapitre 5 (pour plus de détails voir, par exemple, la réf. [5]).

Au chapitre 6, nous définissons des systèmes statistiques plus généraux, en dimension d'espace arbitraire. Par commodité, nous utilisons le langage ferromagnétique même si, à travers les propriétés d'universalité, les résultats qui seront obtenus dans la suite de l'ouvrage s'appliquent à des systèmes statistiques plus généraux. Au-delà des fonctions de corrélation générales et connexes (dont nous rappelons les propriétés de décroissance ou propriété d'amas), que nous avons déjà définies dans les chapitres précédents, nous introduisons les fonctions de vertex, qui sont liées au potentiel thermodynamique. Énergie libre et potentiel thermodynamique, comme fonctions de

corrélation connexes et fonctions de vertex, sont reliés par une transformation de Legendre dont nous étudions quelques propriétés.

Le chapitre 7 est dédié à la notion de transitions de phase, une notion qui est loin d'être triviale dans la mesure où une transition de phase ne peut être engendrée que par l'interaction d'un nombre infini de degrés de liberté. Nous commençons par résoudre exactement un modèle dans la limite où le nombre de dimensions de l'espace tend vers l'infini. Un tel modèle exhibe une transition de phase de type quasi-gaussien ou de champ moyen, comme nous le verrons plus loin. Ensuite, nous discutons de l'existence de transitions de phase en fonction de la dimension d'espace. Nous insistons sur la différence entre modèles avec symétries discrètes et continues en dimension deux.

Au chapitre 8, nous examinons en détail les propriétés universelles des transitions de phases dans les approximations quasi-gaussienne ou de champ moyen. Nous étudions les singularités des fonctions thermodynamiques au point de transition ainsi que le comportement à grande distance de la fonction à deux points. Nous résumons les propriétés d'universalité sous la forme de la théorie de Landau [6]. Nous soulignons les particularités des modèles avec symétrie continue à basse température dues à l'apparition de modes de Goldstone. Enfin, nous évaluons les corrections au modèle quasi-gaussien et montrons que l'approximation quasi-gaussienne n'est cohérente qu'en dimension d'espace supérieure à 4 (nous inspirant de la présentation dans [7]). Nous mentionnons l'existence possible de points tricritiques.

Au chapitre 9, nous introduisons la notion générale de groupe de renormalisation [4] dans l'esprit de l'ouvrage [8]. Nous étudions le rôle des points fixes et leurs propriétés de stabilité. Nous exhibons un point fixe particulier, le point fixe gaussien qui est stable en dimension supérieure à 4. Nous identifions la perturbation principale au point fixe gaussien en dimension ≤ 4 . Nous discutons la possibilité d'identifier un point fixe non-gaussien au voisinage de la dimension 4.

Au chapitre 10, nous montrons qu'avec les hypothèses formulées au chapitre 9, il est possible de trouver, en effet, un point fixe non-gaussien en dimension $d = 4 - \varepsilon$ [9], à la fois dans des modèles avec symétries de réflexion et de rotation. Nous introduisons brièvement les méthodes de théorie des champs [10, 11] que nous reprenons dans les chapitres suivants. Enfin, nous présentons une sélection de résultats numériques concernant des exposants critiques et certains rapports universels d'amplitude [12-16].

Le chapitre 11 contient une discussion générale des équations de groupe de renormalisation, et des propriétés des points fixes correspondants, de toute une classe de modèles qui possèdent des symétries plus générales que les groupes de réflexion et rotation considérés auparavant, généralisant quelque peu les résultats présentés dans [7, 17]. En particulier, une intéressante conjecture, reliant décroissance des fonctions de corrélation et stabilité des points fixes, émerge ainsi.

Avec le chapitre 12, commence une présentation plus systématique des méthodes de théorie des champs. Au-delà de la simple généralisation de méthodes perturbatives déjà présentées dans les chapitres précédents, plusieurs concepts nouveaux sont introduits comme le développement en nombre de boucles, le prolongement et la régularisation dimensionnels [18].

Muni de ces outils techniques, nous pouvons alors justifier, au chapitre 13, les équations de groupe de renormalisation asymptotique de la théorie des champs [3, 19–23]. Des propriétés générales d'universalité s'en déduisent, ainsi que le calcul de quantités universelles en puissances de la déviation $\varepsilon = 4 - d$ à la dimension 4.

La théorie des champs avec symétrie de rotation de type $O(N)$ peut être résolue dans la limite $N \rightarrow \infty$, comme nous le montrons au chapitre 14. Toutes les propriétés universelles démontrées dans le cadre du développement en ε peuvent alors être démontrées, à dimension fixée, dans le cadre d'un développement en $1/N$ [24–33].

Dans les modèles avec symétrie continue, la phase de basse température est dominée à grande distance par l'interaction de modes de Goldstone (de masse nulle). Cette interaction est décrite par le modèle σ non-linéaire. Son étude, par le groupe de renormalisation, permet de généraliser les lois d'échelles de la théorie critique à la transition à toute la phase de basse température et d'étudier les propriétés des transitions de phase au voisinage de la dimension 2 [34–37].

Le groupe de renormalisation de la théorie quantique des champs est un groupe de renormalisation asymptotique qui est basé sur l'hypothèse que le point fixe pertinent est proche du point fixe gaussien. Dès l'origine, des formes plus générales du groupe de renormalisation ne nécessitant pas une telle hypothèse [38–40] ont été proposées. Elles prennent la forme d'équations fonctionnelles qui décrivent l'évolution de l'interaction effective, mais qui sont d'un maniement beaucoup plus difficile que les équations issues de la théorie des champs. Cependant, dans une période récente, elles ont inspiré divers schémas d'approximations différents des développements perturbatifs de la théorie des champs [41]. Pour des raisons à la fois pédagogiques et, donc, pratiques, il nous a paru utile de les décrire dans cet ouvrage.

Enfin, les appendices rassemblent différentes considérations techniques utiles pour la compréhension du texte, ou quelques développements supplémentaires.

Bibliographie

- [1] Beaucoup de détails intéressants et des références sur l'histoire primitive de l'Électrodynamique Quantique et du problème des divergences peuvent être trouvés dans :
S. Weinberg, *The Theory of Quantum Fields*, vol. 1, chap. 1, Cambridge (Cambridge Univ. Press 1995).
Nombre d'articles originaux sont reproduits dans :
J. Schwinger éd., *Selected Papers in Electrodynamics* (Dover, New York 1958).
Voir aussi :
N.N. Bogoliubov and D.V. Shirkov, *Introduction to the Theory of Quantized Fields* (Interscience, New York 1959).
- [2] Une revue de la situation après la construction du Modèle Standard de la physique des interactions fondamentales peut être trouvée dans :
Methods in Field Theory, Les Houches, 1975, R. Balian et J. Zinn-Justin éd. (North-Holland, Amsterdam 1976) ;
C. Itzykson and J.B. Zuber, *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, New York 1980).
Une sélection d'articles originaux a été reproduite dans :
Selected papers on Gauge Theory of Weak and Electromagnetic Interactions, C.H. Lai ed. (World Scientific, Singapore 1981).
- [3] Les idées de groupe de renormalisation en théorie des champs ont été introduites dans :
E.C.G. Stueckelberg and A. Peterman, *Helv. Phys. Acta* 26 (1953) 499 ;
M. Gell-Mann and F.E. Low, *Phys. Rev.* 95 (1954) 1300.
Voir aussi :
N.N. Bogoliubov and D.V. Shirkov, *Introduction to the Theory of Quantized Fields* (Interscience, New York 1959) ;
K.G. Wilson, *Phys. Rev.* 179 (1969) 1499.
- [4] Pour une présentation des idées de groupe de renormalisation appliquées aux phénomènes critiques voir :
L.P. Kadanoff, *Physics* 2 (1966) 263 ;
K.G. Wilson, *Phys. Rev.* B4 (1971) 3174, *ibidem* 3184 ;
K.G. Wilson and J. Kogut, *Phys. Rep.* 12C (1974) 75.

- [5] Une introduction à l'intégrale de chemin dans l'esprit de cet ouvrage est J. Zinn-Justin, *Intégrale de chemin en mécanique quantique : introduction*, (287 pages), Collection Savoir Actuels (EDP Sciences, Les Ulis 2003).
- [6] Pour l'origine de la théorie de Landau voir :
L.D. Landau, *Phys. Z. Sowjetunion* 11 (1937) 26, reproduit dans *Collected Papers of L.D. Landau*, D. ter Haar ed. (Pergamon, New York 1965).
- [7] E. Brézin, J.C. Le Guillou et J. Zinn-Justin, *Field Theory Approach to Critical Phenomena*, contribution à l'ouvrage [11] qui décrit l'application des méthodes de la théorie quantique des champs au calcul des quantités universelles.
- [8] Des détails techniques supplémentaires sur les sujets abordés dans cet ouvrage, exposés dans le même esprit et, de façon plus générale, une présentation unifiée de la théorie quantique des champs telle qu'elle apparaît en physique des particules et dans la théorie des phénomènes critiques peuvent être trouvés dans :
J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena*, Clarendon Press 1989 (4^e éd. Oxford Univ. Press, Oxford 2002).
- [9] L'idée du développement en ε -expansion est due à :
K.G. Wilson and M.E. Fisher, *Phys. Rev. Lett.* 28 (1972) 240.
- [10] Après les articles originaux de Wilson, plusieurs auteurs ont montré que le groupe de renormalisation de la théorie quantique des champs pouvait être appliqué aux phénomènes critiques :
C. Di Castro, *Lett. Nuovo Cimento*. 5 (1972) 69 ;
G. Mack, *Kaiserslautern 1972*, Lecture Notes in Physics, vol. 17, W. Ruhl and A. Vancura eds. (Springer-Verlag, Berlin 1972) ;
E. Brézin, J.C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, *Phys. Rev.* D8 (1973) 434, *ibidem* 2418 ;
P.K. Mitter, *Phys. Rev.* D7 (1973) 2927 ;
G. Parisi, *Cargèse Lectures 1973*, publié dans *J. Stat. Phys.* 23 (1980) 49 ;
B. Schroer, *Phys. Rev.* B8 (1973) 4200 ;
C. Di Castro, G. Jona-Lasinio and L. Peliti, *Ann. Phys. (NY)* 87 (1974) 327 ;
F. Jegerlehner and B. Schroer, *Acta Phys. Austr. Suppl.* XI (1973) 389 (Springer-Verlag, Berlin).
- [11] De nombreux physiciens qui ont participé au développement de ce sujet ont contribué à :
Phase Transitions and Critical Phenomena, vol. 6, C. Domb et M.S. Green eds. (Academic Press, London 1976).
- [12] Les premières estimations précises des exposants critiques, utilisant une idée de Parisi [13] et les séries [14], et basées sur une sommation de Borel de séries divergentes, ont été publiées dans :
J.C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, *Phys. Rev. Lett.* 39 (1977) 95 ;

- J.C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, *Phys. Rev.* B21 (1980) 3976.
Des résultats plus récents ont été publiés dans :
- R. Guida and J. Zinn-Justin, *J. Phys. A* 31 (1998) 8103, cond-mat/9803240.
- [13] L'utilisation de la série perturbative à dimension fixée a été proposée dans :
G. Parisi, *Cargèse Lectures 1973*, publié dans *J. Stat. Phys.* 23 (1980) 49.
- [14] Les séries à dimension fixée ont été publiées dans :
G.A. Baker, B.G. Nickel, M.S. Green and D.I. Meiron, *Phys. Rev. Lett.* 36 (1976) 1351 ;
B.G. Nickel, D.I. Meiron, G.B. Baker, *Univ. of Guelph Report 1977*, qui contient aussi une première estimation des exposants de type Ising.
- [15] Le développement en ε est sommé dans :
J.C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, *J. Physique Lett. (Paris)* 46 (1985) L137 ; *J. Physique (Paris)* 48 (1987) 19 ; *ibidem* 50 (1989) 1365.
- [16] Une estimation de l'équation d'état pour la classe du modèle d'Ising a été publiée dans :
R. Guida and J. Zinn-Justin, *Nucl. Phys.* B489 [FS] (1997) 626.
- [17] Par exemple, le modèle à N composantes avec symétrie cubique a été étudié dans :
D.J. Wallace, *J. Phys. C : Solid State Phys.* 6 (1973) 1390 ;
A. Aharony, *Phys. Rev.* B8 (1973) 3342, 3349, 3358, 3363, 4270, *Phys. Rev. Lett.* 31 (1973) 1494.
- [18] La régularisation dimensionnelle a été introduite dans :
J. Ashmore, *Lett. Nuovo Cimento* 4 (1972) 289 ; G. 't Hooft and M. Veltman, *Nucl. Phys.* B44 (1972) 189 ;
C.G. Bollini and J.J. Giambiagi, *Phys. Lett.* 40B (1972) 566, *Nuovo Cimento* 12B (1972) 20.
- [19] La forme moderne des équations de groupe de renormalisation a été publiée dans :
C.G. Callan, *Phys. Rev.* D2 (1970) 1541 ;
K. Symanzik, *Commun. Math. Phys.* 18 (1970) 227.
Une présentation pédagogique peut être trouvée dans :
S. Coleman, *Dilatations, Erice Lectures 1971*, reproduit dans *Aspects of Symmetry* (Cambridge University Press, Cambridge 1985).
- [20] Les théories critiques ou de masse nulle sont discutées dans :
K. Symanzik, *Commun. Math. Phys.* 7 (1973) 34.
- [21] La forme dite homogène des équations de groupe de renormalisation a été introduite dans :
S. Weinberg, *Phys. Rev.* D8 (1973) 3497 ;
G. 't Hooft, *Nucl. Phys.* B61 (1973) 455 ;
J. Zinn-Justin [22].